

ARTRODESIS: FIJACION O FUSION ARTICULAR (MUÑECA, CARPO Y DEDOS)

Usted tiene derecho a conocer el procedimiento al que va a ser sometido y las complicaciones más frecuentes que ocurren. Este documento intenta explicarle todas estas cuestiones; léalo atentamente y consulte con su médico todas las dudas que se le planteen.

El procedimiento/tratamiento quirúrgico de **ARTRODESIS DE MUÑECAS, CARPO Y DEDOS** consiste en:

1. PREOPERATORIO

Antes de la cirugía será necesario realizarle algunas pruebas diagnósticas con radiografías. También le indicaremos desde qué hora debe permanecer en ayunas.

2. PROCEDIMIENTO

El propósito principal de la intervención es aliviar el dolor producido por una articulación enferma y consecuentemente, mejorar la calidad de vida del paciente a costa de eliminar el movimiento de dicha articulación.

3. LA INTERVENCIÓN PRECISA DE ANESTESIA

Cuyo tipo y modalidad serán valoradas por el Servicio de Anestesia y Reanimación.

4. CONSECUENCIAS SEGURAS

La intervención consiste en conseguir la rigidez total o fusión ósea de una articulación enferma. Pueden utilizarse diferentes técnicas dependiendo de cada caso y de la articulación que se pretenda artrodesar. Estas posibles técnicas incluyen tanto la fijación externa como la utilización de diferentes dispositivos de fijación interna (agujas, tornillos, placas atornilladas, etc.). Puede ser necesaria la utilización de injerto óseo del propio paciente y/o del banco de huesos. También a veces es necesario el retiro de los implantes metálicos

5. RIESGOS GENERALES

Toda intervención quirúrgica, tanto por la propia técnica operatoria como por la situación vital de cada paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad, fumador.), lleva implícitas una serie de complicaciones, comunes y potencialmente serias, que podrían requerir tratamientos complementarios, tanto médicos como quirúrgicos y que, en un mínimo porcentaje de casos, pueden ser causa de muerte.

**RECUERDE, SU SALUD ES IMPORTANTE
Y QUEREMOS DARLE EL MEJOR
CUIDADO, CONSULTE CON SU MÉDICO**

6. LAS COMPLICACIONES:

La intervención quirúrgica de una **MUÑECA, CARPO y DEDOS** pueden ser:

- a) Problemas vásculo-nerviosos secundarios a la utilización del manguito de isquemia.
- b) Infección de la herida quirúrgica.
- c) Lesión de los vasos adyacentes. Si se afecta un gran vaso puede producirse una hemorragia masiva, lo que podría ocasionar incluso la muerte.
- d) Lesión o afectación de los nervios adyacentes, lo que podría ocasionar trastornos sensitivos y/o motores que pueden ser irreversibles.
- e) Enfermedad tromboembólica, que puede dar lugar, en el peor de los casos, a embolismo pulmonar y muerte.
- f) Cicatriz queloidea: Cicatriz gruesa en que influyen factores genéticos.
- g) Reintervención por falta de la fusión o aflojamiento de placa, tornillos o agujas.
- h) Necrosis de la piel (muerte), piel sensible.
- i) Resultados insatisfactorios por dolor o mal alineamiento.
- j) Hematoma que puede requerir reintervención quirúrgica.

Es importante que sepa que en ocasiones, es posible que durante o después de la intervención sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados de la sangre).

Si hubiera una complicación importante, podría ser necesario el traslado a unidad de cuidados intensivo o intermedio u otro hospital. Esto puede aumentar los costos iniciales del presupuesto.

FIRMA _____

**RECUERDE, SU SALUD ES IMPORTANTE
Y QUEREMOS DARLE EL MEJOR
CUIDADO, CONSULTE CON SU MÉDICO**