

## **CIRCUNCISIÓN EN ADULTO**

### **1. Identificación y descripción del procedimiento**

Esta intervención consiste en eliminar la piel prepucial que no permite descubrir el glande o que presenta inflamaciones a repetición ( balanitis ). Esta intervención se realiza con el objetivo de permitir unas relaciones sexuales normales. Esta intervención se realiza con anestesia local y/o regional y/o general y no suele requerir hospitalización,

### **2. Objetivo del procedimiento y beneficios que se esperan alcanzar**

Facilitar las relaciones sexuales y disminuir el riesgo de molestias e infecciones.

### **3. Alternativas razonables a dicho procedimiento**

Existen otras alternativas como observar evolución o la incisión prepucial.

### **4. Consecuencias previsibles de su realización**

Las ya descritas en el primer y segundo apartado.

### **5. Consecuencias previsibles de su no realización**

En su situación actual, el médico tratante considera la presente indicación como la mejor opción entre las posibles, usted es libre de aceptarla o no.

En caso de no aceptar la presente indicación debe saber que existe una elevada probabilidad de persistencia y/o progresión de la sintomatología por la que consultó.

### **6. Riesgos**

De dicha intervención es posible, pero muy poco frecuente, esperar los siguientes efectos secundarios, o complicaciones:

- a) Reacciones alérgicas al anestésico local, que pueden llegar a producir shock anafiláctico.
- b) Infecciones de la herida quirúrgica cuya complicación puede conducir a la pérdida parcial o total del órgano, y riesgo de infección general.
- c) Hemorragia local.
- d) Cicatrices antiestéticas.
- e) Incurvación del extremo del pene
- f) Lesión uretral con aparición de fístulas.

### **7. Riesgos en función de la situación clínica del paciente**

Es necesario que nos informe de las posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, enfermedades cardio-pulmonares, renales, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia que pudiera complicar la intervención o agravar el postoperatorio.

Si presenta diabetes, obesidad, inmunodepresión, hipertensión, anemia, edad avanzada..., puede aumentar la frecuencia o gravedad de riesgos o complicaciones, por lo que el riesgo quirúrgico general es mayor.

**RECUERDE, SU SALUD ES IMPORTANTE Y  
QUEREMOS DARLE EL MEJOR CUIDADO,  
CONSULTE CON SU MÉDICO**