HOSPITAL CLINICO FUSAT

Implantación de prótesis de pene

1. Identificación y descripción del procedimiento

Las prótesis peneanas son unos cilindros semirrígidos o inflables, de diferentes tamaños, de material biocompatible y por lo tanto habitualmente bien tolerados. Se colocan dentro de los cuerpos cavernosos mediante una intervención de gravedad moderada. Para llegar a los cuerpos cavernosos se realiza una incisión en el pene, escroto o en la zona perineal o pubiana.

Esta prótesis produce una rigidez del pene de forma permanente u ocasional dependiendo del tipo de estas, apropiada para realizar el coito.

No altera la sensibilidad del pene, ni recupera la eyaculación ni el orgasmo si estos no estaban presentes previamente. Por otra parte, no altera estas funciones cuando son normales. Tampoco provoca cambios en el glande, salvo que existan complicaciones.

La implantación se realiza habitualmente con anestesia regional y/o general. La hospitalización postoperatoria suele ser de 1 a 4 días.

2. Objetivo del procedimiento y beneficios que se esperan alcanzar

Restaurar una erección capaz de devolver una relación psico-sexualmente satisfactoria.

3. Alternativas razonables a dicho procedimiento

La disfunción eréctil o impotencia puede ser tratada de varias formas, dependiendo de la causa que la origina; usted ya ha sido informado de ellas y ha decidido la colocación de una prótesis peneana.

4. Consecuencias previsibles de su realización

Las ya descritas en los apartados uno y dos de este documento.

5. Consecuencias previsibles de su no realización

Este procedimiento es voluntario

6. Riesgos

Pueden presentarse los siguientes efectos secundarios o complicaciones:

- No conseguir una erección satisfactoria, dolor prolongado en el pene, falla mecánica de alguno de los componentes de la prótesis.
- Perforación de la albugínea distal (componente de la estructura del pene).
- Intolerancia o complicaciones derivadas de la herida quirúrgica que conllevan la retirada de la prótesis y nueva intervención.
-

7. Riesgos en función de la situación clínica del paciente

Es necesario que nos informe del uso de aspirina, anticoagulantes o antiinflamatorios así como de las posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, enfermedades cardio-pulmonares, renales, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia que pudiera complicar la intervención o agravar el postoperatorio.

RECUERDE, SU SALUD ES IMPORTANTE Y QUEREMOS DARLE EL MEJOR CUIDADO, CONSULTE CON SU MÉDICO