

NEFROSTOMIA VIA ABIERTA

1. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

La nefrostomía abierta es una intervención quirúrgica que consiste en la colocación de un catéter o sonda en el riñón a través de una incisión en la zona lumbar, que permite llegar directamente al riñón para instalar la sonda de drenaje de la vía urinaria.

Habitualmente la principal finalidad es : Evacuar la orina de un riñón que tiene dificultades para hacerlo por su vía natural (uréter) por obstrucción, cálculos, infección, etc. Se realiza con anestesia general. El tiempo de permanencia de este catéter es variable dependiendo del motivo por el cual fue colocada ,puede dejarse por varias semanas para mejorar o recuperar la función del riñón.

En algunos casos esta nefrostomía es la forma definitiva de mantener la función del riñón. En estos pacientes habitualmente se coloca una sonda más gruesa.

2.- OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO Y BENEFICIOS QUE SE ESPERAN ALCANZAR

La finalidad del procedimiento consiste en el adecuado diagnóstico y /o resolución de la obstrucción de la vía urinaria.

3.- ALTERNATIVAS RAZONABLES AL PROCEDIMIENTO

.Las alternativas son abordaje por vía natural (a través de conductos naturales: uretra y uréter), por abordaje laparoscópico o percutáneo (nefrostomía percutanea), pero en su caso la mejor opción es el abordaje abierto

4.-CONSECUENCIAS PREVISIBLES DE SU REALIZACIÓN

- a) Derivación de la orina del riñón obstruido.
- b) Realización de estudios para diagnosticar la causa de la obstrucción.
- c) En caso necesario, aplicar tratamientos a través de la misma.

5.- CONSECUENCIAS PREVISIBLES DE SU NO REALIZACIÓN

Avance de la enfermedad con agravamiento e imposibilidad posterior, en ocasiones, de tratamiento curativo.

6.- RIESGOS

- Sangrado leve a través del catéter o en la zona de la punción.
- Persistencia parcial de la colección, es decir, del acúmulo de orina, pus, sangres u otro material.
- Fístulas temporales en la zona puncionada.

Hay otras complicaciones que suelen ser las menos frecuentes.

- Imposibilidad de llevar a cabo el drenaje y/o persistencia total de la colección.
- Reacciones vagas (mareos, sudoración, palpitaciones, etc...) de intensidad variable que incluso pueden llevar a la pérdida de conocimiento.
- Hemorragia tanto durante el acto quirúrgico como en el postoperatorio cuyas

**RECUERDE, SU SALUD ES IMPORTANTE
Y QUEREMOS DARLE EL MEJOR
CUIDADO, CONSULTE CON SU MÉDICO.**

consecuencias y gravedad pueden ser muy diversas. Dependerá de su intensidad, oscilando desde una gravedad mínima hasta la posibilidad de riesgo para su vida.

Se puede precisar la utilización de sangre y hemoderivados.

- Rotura de instrumentos o de catéteres. Pueden quedar restos en el interior del cuerpo y que sean necesarias otras maniobras o intervenciones para su extracción.
- Perforación de asa intestinal u otros órganos con el consiguiente riesgo grave de peritonitis y hemorragia.
- Sepsis e infección generalizada, que puede resultar grave, incluyendo riesgo para su vida
- Problemas derivados de la herida quirúrgica: infección, apertura de los puntos de sutura, fístulas temporales o permanentes, defectos estéticos derivados de algunas de las complicaciones anteriores o procesos cicatriciales anormales, intolerancia a los materiales de sutura, que puede precisar reintervención para su extracción, aumento (hiperestesias) o disminución (hipoestesias) de la sensibilidad de la zona, y/o molestias dolorosas (neuralgias).
- Reacciones alérgicas o efectos indeseables, de intensidad variable, asociados a los medicamentos que se considere preciso administrarle.

La mayoría de estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico (medicamentos, sueros...) pero pueden llegar a requerir una nueva intervención, generalmente de urgencia, incluyendo un riesgo para su vida.

7.- Consecuencias previsibles de su no realización.

En su situación actual, el médico urólogo considera la presente indicación como la mejor opción entre las posibles. No obstante y dado que ha recibido cumplida información, usted es en último término libre de aceptarla o no.

En caso de no aceptar la presente indicación debe saber que existe una elevada probabilidad de persistencia y/o progresión de la sintomatología por la que consultó o de sus enfermedades de base. Las posibles complicaciones que en un futuro puedan acaecer y su alcance, son en buena parte imprevisibles, incluyendo el riesgo vital. Es necesario que nos informe de las posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, enfermedades cardio-pulmonares, renales, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia que pudiera complicar la intervención o agravar el postoperatorio.

Si presenta diabetes, obesidad, inmunodepresión, hipertensión, anemia, edad avanzada..., puede aumentar la frecuencia o gravedad de riesgos o complicaciones, por lo que el riesgo quirúrgico general es mayor