

RESECCION DE LESIONES LOCALIZADAS EN PARTES BLANDAS EN NIÑOS

En qué consiste y para qué sirve:

La intervención consiste en extirpar lesiones como quistes, nevus (lunares), papilomas, granulomas, u otras como _____, que se encuentren localizadas en la piel o el tejido celular subcutáneo (tejido graso) en las distintas partes del cuerpo.

Cómo se realiza:

Habitualmente es una intervención que se realiza en forma ambulatoria. A veces, en función de la edad, tamaño, profundidad y localización de la lesión, puede requerir anestesia general o local.

Se hace una incisión en la piel, siguiendo las líneas de tensión para lograr un mejor resultado estético de la cicatriz.

Cuando la lesión compromete sólo la piel, se extirpa el trozo de piel que contiene la lesión, posteriormente se cierra con suturas que pueden reabsorberse o que deban retirarse.

Cuando la lesión es más profunda, se abre cuidadosamente el tejido graso hasta encontrar la lesión, extirpándola completamente. Se verifica que no queden vasos sangrantes y se procede al cierre por planos.

Todo el tejido extirpado siempre se envía a biopsia.

Qué efectos le producirá:

Toda incisión en la piel dejará una cicatriz permanente, la mayoría de estas cirugías son pequeñas, y la elección de la incisión ayuda para dejar la menor cicatriz posible, pero algunas veces, requerirá tratamiento de la cicatriz mediante kinesiología para lograr el mejor resultado estético. El resultado final de la cicatriz es individual y depende de la capacidad de cicatrización de cada persona.

Puede producirse un poco de dolor en la zona de la herida, que es manejable con analgésicos.

En qué le beneficiará:

Se eliminará la lesión que causa las molestias, ya sea estéticas o funcionales ocasionadas por el aumento de volumen.

Se conocerá definitivamente el diagnóstico al tener el resultado de la biopsia.

Qué riesgos tiene:

Cualquier actuación médica tiene riesgos. La mayor parte de las veces los riesgos no se materializan, y la intervención no produce daños o efectos secundarios indeseables. Pero a veces no es así. Por eso es importante que usted conozca los riesgos que pueden aparecer en este proceso o intervención.

RECUERDE, SU SALUD ES IMPORTANTE Y QUEREMOS DARLE EL MEJOR CUIDADO, CONSULTE CON SU MÉDICO

Los más frecuentes:

- a. Sangrado de la herida.
- b. Infección de la herida.
- c. Dehiscencia de sutura (la herida se abre), Debe sanar con curaciones.
- d. Dolor prolongado en la zona de la operación.
- e. Fibrosis en la zona operatoria, que se manifiesta como endurecimiento en la zona de la cicatriz, es transitorio y depende de la cicatrización individual.
- f. Reparación de algunas lesiones.
- g. Cicatriz queloídea o hipertrófica con un mal resultado estético.

Los más graves:

(Depende de la localización, tamaño y profundidad de la lesión):

- a. Lesión de estructuras nerviosas produciendo zonas con anestesia permanente o parálisis de algunos músculos.
- b. Extirpación de lesiones malignas sin los márgenes oncológicos correspondientes (generalmente requiere reoperación).
- c. Reacción alérgica grave a los anestésicos locales, que podría llegar a producir un shock potencialmente grave y que requeriría atención médica urgente.

RECUERDE, SU SALUD ES IMPORTANTE Y QUEREMOS DARLE EL MEJOR CUIDADO, CONSULTE CON SU MÉDICO