

Varicocele (Ligadura de venas espermáticas)

1. Identificación y descripción del procedimiento

El varicocele consiste en la dilatación anormal de las venas del testículo.

Su diagnóstico se produce por notar síntomas tales como sensación de pesadez escrotal o aumento del tamaño intraescrotal sobre todo al hacer algún esfuerzo (defecación, elevación de pesos, etc), o bien ser un hallazgo en el estudio por infertilidad masculina.

La intervención consiste en localizar, ligar y seccionar las venas testiculares anormalmente dilatadas. A través de una incisión inguinal con anestesia regional o general. El postoperatorio de esta intervención es corto.

2. Objetivo del procedimiento y beneficios que se esperan alcanzar

Mejorar la fertilidad.

Mejorar las molestias que el varicocele puede ocasionar.

3. Alternativas razonables a dicho procedimiento

Embolización, escleroterapia o técnica microquirúrgica.

4. Consecuencias previsibles de su realización

Las ya descritas en los apartados uno y dos de este documento.

5. Consecuencias previsibles de su no realización

En su situación actual, el medico tratante considera la presente indicación como la mejor opción entre las posibles, no obstante y dado que ha recibido cumplida información, usted es en último término libre de aceptarla o no.

En caso de no aceptar la presente indicación debe saber que existe una elevada probabilidad de persistencia y/o progresión de la sintomatología por la que consultó o de sus enfermedades de base. Las posibles complicaciones que en un futuro puedan acaecer son imprevisibles.

6. Riesgos

De dicha intervención es posible pero muy poco frecuente esperar los siguientes efectos secundarios o complicaciones:

a) En un porcentaje de casos en la fertilidad no mejora a pesar de la corrección del varicocele.

b) Persistencia de las molestias. Persistencia de las dilataciones varicosas en el escroto.

c) Otras posibles complicaciones pueden ser:

*Formación de un hidrocele (líquido en el escroto).

*Formación de un hematoma escrotal.

*Atrofia del testículo.

*Hemorragia tanto durante el acto quirúrgico como en el postoperatorio

*Problemas y complicaciones derivados de la herida quirúrgica:

-Infección en sus diferentes grados de gravedad.

-Dehiscencia de sutura (apertura de la herida) que puede necesitar una intervención secundaria.

**RECUERDE, SU SALUD ES IMPORTANTE Y
QUEREMOS DARLE EL MEJOR CUIDADO,
CONSULTE CON SU MÉDICO**

- Fístulas permanentes o temporales.
- Defectos estéticos derivados de alguna de las complicaciones anteriores o procesos cicatriciales anormales.
- Intolerancia a los materiales de sutura que puede llegar incluso a la necesidad de reintervención para su extracción.
- Neuralgias (dolores nerviosos), hiperestesias (aumento de la sensibilidad) o hipoestesias (disminución de la sensibilidad).

7. Riesgos en función de la situación clínica del paciente

Es necesario que nos informe de las posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, enfermedades cardio-pulmonares, renales, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia que pudiera complicar la intervención o agravar el postoperatorio.